

PREPARAZIONE GASTROSCOPIA IN SEDAZIONE

Il paziente deve rimanere a digiuno dalla mezzanotte del giorno precedente, non va assunto cibo o liquidi, acqua compresa. Il paziente dovrà comunque assumere la sua abituale terapia farmacologica (es. farmaci antipertensivi) in pochissima acqua.

Se la gastroscopia è prenotata nel pomeriggio, il paziente dovrà rispettare un digiuno di almeno 5 ore; potrà comunque fare una colazione leggera, preferibilmente composta da fette biscottate, succhi di frutta, camomilla o the.

Per quanto riguarda la sera precedente l'esame, si consiglia una cena leggera, preferibilmente una minestra in brodo vegetale.

ESAMI RICHIESTI

Per i pazienti di età superiore a 50 anni si richiede:

- ECG con visita cardiologica;
- Esami ematici: emocromo, sodiemia, potassiemia, glicemia, azotemia, creatininemia, calcemia, INR

PAZIENTE CARDIOPATICI: Opportuno ottenere il nulla osta cardiologico alla procedura.

È NECESSARIO SOSPENDERE:

- Antiaggreganti (aspirina, aspirinetta, tiklopidina, ecc) per almeno 7 giorni prima della procedura, previo consenso del Cardiologo
- Eanticoagulanti (coumadin, sintrom, ecc) per almeno 7 giorni, previo consenso del proprio medico curante. Se necessario sostituire con eparine a basso peso, eseguire l'INR il giorno precedente l'esame, se il valore è maggiore di 2 (INR>2) non verranno eseguite le biopsie.

È importante portare eventuali esami precedentemente eseguiti, cartelle cliniche e tutto quanto possa risultare utile ad una maggiore conoscenza delle condizioni cliniche del paziente. Munirsi di impegnativa del medico curante o dello Specialista di riferimento.

CONSIDERATA LA SEDAZIONE PROFONDA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME, È OBBLIGATORIO VENIRE ACCOMPAGNATI

N.B.

Dopo la procedura è vietato mettersi alla guida

PREPARAZIONE ALLA COLONSCOPIA IN SEDAZIONE CON PIZZICANNELLA E FORTI

Il paziente deve seguire scrupolosamente le seguenti istruzioni:

- **3 GIORNI PRIMA DELL'ESAME:** dieta priva di scorie (evitare frutta, verdura, legumi)
- **IL GIORNO PRECEDENTE L'ESAME:** pranzo leggero senza frutta e verdura, poi solo liquidi (thè, brodino, succhi di frutta, camomilla, etc..)
- **IL GIORNO PRECEDENTE L'ESAME:** pranzo leggero senza frutta e verdura, poi solo liquidi (thè, brodino, succhi di frutta, camomilla, etc..)

Seguire tali orari:

- **DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 17:00 DEL GIORNO PRECEDENTE:** assumere citrafleet o picoprep con un bicchiere d'acqua, successivamente bere altri 2 litri di acqua (sorvegliando lentamente)
- **DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 20:00 DEL GIORNO PRECEDENTE:** assumere citrafleet o picoprep con un bicchiere d'acqua, successivamente bere altri 2 litri di acqua (sorvegliando lentamente)
- **DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 08:00 DEL GIORNO DELL'ESAME:** assumere citrafleet o picoprep con un bicchiere d'acqua, successivamente bere altri 3 litri di acqua (sorvegliando lentamente)

È necessario sospendere:

- **ANTIAGGREGANTI** (aspirina, aspirinetta, tiklopidina, plavix, duoplavin, etc..) per almeno 7 giorni prima della procedura previo consenso cardiologico.
- **ANTICOAGULANTI** (coumadin, sintrom, pradaxa, xarelto, eliquis, lixiana) se necessario sostituire con eparine a basso peso molecolare previo consenso cardiologico.

ESAMI RICHIESTI

Per i pazienti di età superiore a 50 anni si richiede:

- Egg con referto cardiologico;
- Esami ematici: emocromo, sodiemia, potassiemia, glicemia, azotemia, creatinina, calcemia, INRm

N.B.

Per i pazienti cardiopatici è opportuno ottenere il nullaosta cardiologico alla procedura

N.B.

Per poter eseguire la procedura il paziente dovrà esser accompagnato da un familiare o da una persona di fiducia. Non sarà possibile guidare per le 24 ore successive.

PREPARAZIONE COLONSCOPIA DOTTOR NERI E DOTTORESSA REA

FARMACO UTILIZZATO: MOVIPREP

La confezione di **MOVIPREP** (reperibile in farmacia) contiene 2 buste: ogni busta a sua volta contiene una bustina grande "A" ed una bustina piccola "B".

Ogni busta (A+B) deve essere sciolta in 1 litro d'acqua. La preparazione totale è composta da 2 litri di soluzione.

UNA BUONA PREPARAZIONE ALL'ESAME E' FONDAMENTALE PER L'ACCURATEZZA DIAGNOSTICA DELL'INDAGINE E PER L'ESECUZIONE DELLE PROCEDURE ENDOSCOPICHE.

Nei giorni precedenti l'esame è raccomandata una dieta priva di scorie;

NO (frutta, verdura, alimenti integrali, legumi)

SI (uova, carni rosse o bianche, pesce, brodo, omogeneizzati).

PREPARAZIONE

Per la preparazione della soluzione, aprire la confezione con le due bustine (A+B), scioglierle entrambe in 1 litro di acqua non gassata e mescolare bene fino a che la polvere non si è sciolta completamente.

Eseguire la stessa procedura per la seconda parte di preparazione.

Bere il tutto con un bicchiere.

La soluzione deve essere bevuta nell'arco di 1-2 ore.

IL GIORNO DELL'ESAME: DIGIUNO ASSOLUTO (NON MANGIARE E NÈ BERE)

DIETA DA SEGUIRE

- **COLAZIONE DEL GIORNO PRECEDENTE L'ESAME:** the, fette biscottate, biscotti, latte, caffè;
- **PRANZO DEL GIORNO PRECEDENTE L'ESAME (ore 12:00):** brodo, prosciutto magro;
- **CENA GIORNO PRECEDENTE L'ESAME:** solo liquidi (brodo, the, camomilla).

ASSUNZIONE

Se l'esame si fa al mattino

- 1 litro di MOVIPREP dalle 15:00 ALLE 16:00 del giorno precedente l'esame;
- 1 litro di MOVIPREP dalle 18:00 ALLE 19:00 del giorno precedente l'esame;
- 1 litro di acqua a seguire durante la serata

Se l'esame è nel pomeriggio o nella tarda mattinata (dopo le 11:00):

- 1 litro di MOVIPREP dalle 18:00 ALLE 19:00 del giorno precedente l'esame;
- Mezzo litro di acqua a seguire;
- PAUSA NOTTURNA
- 1 litro di MOVIPREP dalle 7:30 alle 8:30;
- Mezzo litro di acqua a seguire

È necessario sospendere:

- **ANTIAGGREGANTI** (aspirina, aspirinetta, tiklopidina, plavix, duoplavin, etc..) per almeno 7 giorni prima della procedura previo consenso cardiologico.
- **ANTICOAGULANTI** (coumadin, sintrom, pradaxa, xarelto, eliquis, lixiana) se necessario sostituire con eparine a basso peso molecolare previo consenso cardiologico.

ESAMI RICHIESTI

Per i pazienti di età superiore a 50 anni si richiede:

- Egg con referto cardiologico;
- Esami ematici: emocromo, sodiemia, potassiemia, glicemia, azotemia, creatinina, calcemia, INRm

N.B.

Per i pazienti cardiopatici è opportuno ottenere il nullaosta cardiologico alla procedura

N.B.

Per poter eseguire la procedura il paziente dovrà esser accompagnato da un familiare o da una persona di fiducia. Non sarà possibile guidare per le 24 ore successive.